Réanimation de l'enfant

Basic Life Support

Nourrisson | **Enfant**

Tester la conscience
Secouer, pincer,
appeler à l'aide

Dégager les voies aériennes
Basculer la tête vers l'arrière,
relever le menton,
avancer la mâchoire inférieure

Contrôler la bouche



Contrôler la bouche

Tester la respiration
Observer, écouter, sentir

5 compressions thoraciques

5 compressions thoraciques

5 compressions abdominales

Respiration artificielle
5 insufflations

5 tapes dorsales



Bouche à (bouche + nez)

Bouche à bouche

5 tapes dorsales

Si pas d'ampliation thoracique, suspecter
un corps étranger et l'éliminer

Tester le pouls

Palper le pouls huméral.
Massage cardiaque externe si
fréquence inférieure à 60/min

Palper le pouls carotidien.
Massage cardiaque externe
si pas de pouls.

Massage cardiaque externe et respiration artificielle

Nourrissons : 2 doigts
ou 2 mains entourant le thorax,
pouces sur ½ inférieure du
sternum

fréquence ~ 100/min
amplitude "forte"
30 compressions : 2 insufflations ou
15 compressions : 1
(si 2 personnes)



Enfants : 2 mains, paumes sur
½ inférieure sternum

demander des secours,
poursuivre la réanimation

Basé sur recommandations AHA, 2000 et 2005, images de Laerdal .