

Tableau I : Solutions orales et comprimés à application buccale en liste PHEL et liste réservée.

Produit	Bucco-Tantum® collutoire	SANGEROL collutoire mint s sucre	Drossadin®	Chlorhrexamed® forte	Gargarisme contre les aphtes (solution CHUV)	Soin de bouche BICHSEL (banane)	Tyroqualine®
Principes actifs ^{3,6,7}	Benzydamine HCl 1.5 mg/ml (=0.15%).	Lidocaïne HCl 0.35 mg/ml (=0.035%) Lysosyme HCl 0.53 mg/ml (= 0.053%) Tyrothricine 0.66 mg/ml (= 0.06%)	Hexétidine 1 mg/ml (= 0.1%)	Chlorhexidine digluconate 2 mg/ml (= 0.2%)	NaHCO₃ 0.6% (= 6 mg/ml) Diphenhydramine 0.01% (= 0.1 mg/ml) Lidocaïne 0.17% (= 1.7 mg/ml)	NaHCO₃ 0.7% (= 7 mg/ml) dans NaCl 0.9%	Déqualinium (0.15 mg) Tyrothricine (1 mg) Lidocaïne (1 mg)
Teneur en alcool ^{3,6,7}	10.7%	0	4.8%	0	0	0	0
Indication ^{3,6,7}	Douleurs et irritations bucco-pharyngées.	Désinfectant local et analgésique lors d'infections buccopharyngées (stomatite, pharyngite, etc.). Médication adjuvante lors de laryngite et d'angine. Traitement pré- et post-chirurgies buccales.	Affections inflammatoires aiguës au niveau bucco-pharyngien. Traitement d'appoint en cas d'angine, laryngite, pharyngite, stomatites, aphtes, etc. Traitement pré- et postopératoire lors d'ablation des amygdales Inflammations des alvéoles dentaires, muguet, mauvaise haleine, blessures au niveau buccal et pharyngien.	Traitement d'appoint temporaire en cas de gingivite et après une intervention de chirurgie parodontale	Aphtes	Humidification de la muqueuse buccale et diminution de l'acidité de la salive. [...] Utilisé surtout en gériatrie et en soins palliatifs, mais aussi en cas d'insuffisance immunitaire, en thérapie chimique ou radiologique, en cas d'intubation.	Affections inflammatoires aiguës au niveau bucco-pharyngien. Traitement post-chirurgie dentaire.
Posologie officielle ^{3,6,7}	10 ml à gargariser/rincer pendant 20-30 sec.	Rincer/gargariser la bouche pendant 30-60 sec avec 15 ml de solution. Max 5x/j, pendant 3-5 jours max.	Rincer 2x/j après repas avec 15 ml de solution pendant 30 sec. Gargariser si besoin.	Rincer 2x/j avec 10 ml de solution pendant 1 min. Ne pas rincer la bouche avec de l'eau après. Durée 3 sem (gingivite) à (2-) 10 sem (chirurgie parodontale)	Adultes: 1 cuillère à soupe (15 ml) non dilué 3 à 5 fois par jour. Enfants : tamponner localement à l'aide d'un coton-tige ou administrer selon OM.	Rincer 2-5x/j avec 15 ml de solution.	Laisser fondre 1 pastille/h, puis après amélioration des symptômes 1 pastilles par 4-5h. Max 8 pastilles/jour
Prix et volume par unité ²	7.43 CHF/emballage 200 ml*	10.20 CHF /emballage 200 ml	8.60 CHF/emballage 200 ml	12.06 CHF /emballage 300 ml*	12.40 CHF /emballage 250 ml*	6.50 CHF/emballage 100 ml	5.35 CHF/emballage 36 pce
Consommation 2021 [pce]	49 (HRC 16 ; Valmont 19 ; Nant 6 ; Rive-Neuve 6 ; Lavaux 2)	77 (HRC 2 ; EMS 60 ; Lavaux 1 ; Autres (CIC) 14)	151 (HRC 38 ; EMS 107 ; PSPE 2 ; Nant 2 ; Valmont 1 ; Unité addiction Aigle 1)	351 (HRC 339, dont 316 pour les soins intensifs et intermédiaires ; Nant 12)	347 (HRC 235 ; EMS 16 ; Lavaux 39 ; Rive-Neuve 26 ; PSPE 3 ; Autres (Feelgood Onco) 28)	1'155 (HRC 832 ; EMS 40 ; Lavaux 160 ; Rive-Neuve 78 ; Valmont 23 ; PSPE 13 ; Nant 9)	8'892 (HRC 4'572 ; EMS 1'836 ; Nant 720 ; Lavaux 540 ; Valmont 396 ; Rive-Neuve 324 ; CIC + Laclinic 468)

* Pas de prix public officiel : prix calculé sur la base des données des fournisseurs.