

ANTI FONGIQUES PER OS



Attention hors commerce en Suisse 2026

Miconazole

Avantages :

- Très efficace, action rapide.
- Bonne adhérence muqueuse.

Inconvénients :

⚠ Contre-indiqué < 4 mois (risque de fausse-route). Interactions possibles (CYP3A4).

Indication : Enfant > 6 mois, muguet simple ou modéré, en première intention si toléré.



Nystatine

Avantages :

- Antifongique efficace localement, utilisé depuis longtemps.
- Très sûr dès la naissance.

Inconvénients :

- Moins adhérent que le Daktarin → action un peu plus lente.
- Nécessite plusieurs applications par jour.

Indication : Muguet léger, nourrisson/allaitement, traitement local doux.



Amphotéricine B

Avantages :

- Très bien toléré, sans risque de fausse-route.
- Pas d'interaction médicamenteuse.

Inconvénients :

Goût amer, observance parfois plus difficile.

Indication : Nourrisson < 6 mois ou si Daktarin contre-indiqué. Alternative sûre et efficace.



Fluconazole

Avantages :

- Traitement systémique puissant.
- Très efficace en cas d'atteinte œsophagienne, récidives ou immunodépression.

Inconvénients :

- Risque d'effets hépatiques, interactions.
- Prescription médicale stricte.

Indication : Forme sévère, récidivante, ou patient immunodéprimé.

ANTIMYCOTIQUES TOPIQUES

Clotrimazole 1^{er} choix général

- Imazole® crème/pâte
- Fungtox crème
- Canesten® crème
- Corisol® crème
- Très large spectre: **Candida**, dermatophytes, levures, champignons.
- **Très bonne tolérance** cutanée.
- Très utilisé en pédiatrie **dès la naissance** (bien toléré en topique).
- Idéal pour intertrigos, candidoses du siège, plis, candidoses axillaires.
- Moins d'irritation locale que le miconazole
- Moins rapide que la terbinafine sur les dermatophytes purs, mais suffisant en pédiatrie.



Econazole 1^{er} choix dans candidoses cutanées "humides"

- Pevaryl® crème
- Spectre très large : dermatophytes, **Candida**, levures, moisissures.
- Très efficace dans les candidoses humides (intertrigos macérés sous les seins, cou).
- Alternative efficace quand clotrimazole insuffisant.
- Mycoses mixtes Candida + dermatophytes.
- Préférer clotrimazole **chez < 2 ans** (mais pas de contre-indication stricte).
- Irrite légèrement plus que clotrimazole



Miconazole 1^{er} choix si zone «humide» + surinfection bactérienne

- Daktarin® crème
- Très bon spectre antifongique dont **Candida**
- Dès la naissance pour les crèmes topiques.
- Effet antibactérien **Gram+** : utile dans les intertrigos macérés avec surinfection ex : candidose + strepto/staph léger (**plis fessiers, perlèches**)
- Irritation locale possible



Terbinafine

- Lamisil® crème
- Fung-X Derma® crème
- Terbinafin Zentiva® crème
- Terbinafin-Mepha® crème
- Action très fongicide (tue le dermatophyte) → **plus rapide** dans :
 - **Tinea corporis**, pedis (dermatophytaires **annulaire**, sèche, non macérée)
- ⚠ **Pas idéale pour Candida !**
- ⚠ **≥ 12 ans !**
- Légère irritation possible.

