

SABA*

Short Acting Beta Agonist

POSSIBLES EN MONOTHERAPIE ET ADAPTES
POUR LES CRISES D'ASTHME

durée de l'effet

3-6 heures



VENTOLIN®

Salbutamol

Effet en 1-5 min.

Pic: 15-60 min

3-6 heures



BRICANYL®

Terbutaline

Effet en 1-5 min.

Pic: 15-60 min

6-8 heures



BERODUAL®

Fenoterol

Effet en 5 min.

Pic: 30-60min.

+ Ipratropium

12 heures



OXIS®

Formotérol

Effet en 3 min.

Pic: 15 min.



que en poudre
→ dès 6 ans !



El > que salbutamol:
• tachycardie,
tremblements,
agitation
• hypokaliémie

+

El anticholinergiques:

- bouche sèche
- tbl visuel
- rétention urinaire



que en poudre
→ dès 6 ans !



DOSPIR®

(en hôpital)

Salbutamol

+

Ipratropium

LABA**

Long Acting Beta Agonist

NON ADAPTES EN MONOTHERAPIE NI POUR
TRAITEMENT DES CRISES D'ASTHME



VANAIK® 100/6, 200/6

SYMBICORT® 100/6, 200/6, 400/12

Formotérol

6/12

(Oxis®)

Effet en 3 min

(Max. 15 min)

Durée 12h

+

Budésonide

100/200

(Pulmicort®)

Durée: 2-3h



SEREVENT® 25/50

Salmeterol

Effet en 17 min.

(Max. 3h)

Durée 12h



SERETIDE® 50/100/125/250

Salmeterol

25/50/25/250

(Serevent®)

Effet en 30-50 min.

(Max. 3h)

Durée 12h

Fluticasone

propionate*

50/100/125/250

(Axotide®),

Durée: 8h



RELVAR® 92/22, 184/22

Vilanterol

Effet en 5-15 min.

(Max. 15 min.)

Durée 24h

+

Fluticasone furoate*

(Arnuity Ellipta®, Avamys®)*

Corticoïde inhalé	Dose faible (µg/j)	Dose moyenne (µg/j)	Dose haute (µg/j)	Source
Fluticasone propionate (Axotide®, Seretide®)	100-200	250-500	> 500	GINA 2024 et 1'000 mcg dès 12 ans
Budesonide (Pulmicort®, Vannair®) et Symbicort®	200-400	400-800	> 800	GINA 2024 et 1'600 mcg dès 12 ans
Fluticasone furoate (Relvar®)	50	92	184	EMA PI + GINA 2024

* Le fluticasone furoate (RELVAR®) est 5x plus puissant que fluticasone propionate (AXOTIDE®, SERETIDE®)
→ Une administration de fluticasone furoate à 92 µg 1x/j est comparable à 250 µg de fluticasone propionate 2x/j.