

Nom, Prénom:

Date de naissance :

9 mois



Compétences motrices

- Tient assis sans appui (P3 : 6 mois ; P97 : 9 mois)
- Attrape en pince semi fine (pouce-index avec pulpe latérale)(P3 : 8 mois ; P97 : 12 mois) et le transfère d'une main à l'autre (P3 : 6 mois ; P97 : 10 mois)
- Se déplace (rampe, pivote, quatre pattes) (P3 : 8 mois ; P97 : 12 mois)
- Lâche un cube pour en prendre un 2^{ème} (P3 : 9 mois ; P97 : 13 mois)
- Mange avec les doigts (P3 : 7 mois ; P97 : 15 mois)
- Se dresse avec appui (P3 : 8 mois-P97 : 13 mois)

Compétences sociales / affectives

- Sourit aux visages familiers, rit aux éclats, cris de joie (P3 : 6 mois ; P97 : 9 mois)
- Imite actions simples et mimiques: tire la langue, ouvre la bouche, gonfle les joues, tape sur la table, secoue un hochet (P3: 8 mois, P97: 12 mois)
- Début de la peur de l'étranger (P3 : 8 mois ; P97 : 12 mois)

Compétences langagières / communication

- Syllabes doubles avec consonnes : "ba-ba", "da-da", "ma-ma", "pa-pa", "ta-ta", "ga-ga" (P3 : 6 mois ; P97 : 10 mois)
- Changement d'intonations, plus chantantes (P3 : 8 mois ; P97 : 12 mois)
- Réagit à son prénom (P3 : 7 mois ; P97 : 10 mois)
- Fait «bye-bye» puis «bravo» (P3 : 8 mois ; P97 : 14 mois)

Compétences cognitives (pensée, raisonnement, exploration)

- Essaie de récupérer un objet perdu (P3 : 6 mois ; P97 : 9 mois)
- Explore activement son environnement (P3 : 8 mois ; P97 : 12 mois)
- Anticipation : ouvre la bouche devant la cuillère, tend les bras quand on va le porter (P3 : 6 mois ; P97 : 12 mois)
- Permanence de l'objet : si on cache l'objet partiellement → L'enfant tire sur le tissu ou soulève la couverture (P3 : 8 mois ; P97 : 11 mois)

Guidance parentale & prévention

- Alimentation diversifiée, repas familiaux, textures variées, sans boissons sucrées. Pas de biberon la nuit, début de la cuillère et du verre. Brossage des dents 1x/jour au dentifrice fluoré 500 ppm+ Vitamine D quotidienne. Constipation
- Sommeil : 11–12 h/nuit + 1 sieste, endormissement autonome. Routines apaisantes, sans écrans avant avant 3 ans le coucher. Favoriser les interactions : lecture, comptines, jeux simples, échanges vocaux. Favoriser la socialisation : jeux avec pairs, adaptation crèche ou nounou.
- Environnement sans fumée.
- Prévenir les accidents : chutes, brûlures (casserolles, fer à repasser), intoxications (médicaments, produits ménagers), noyade, escaliers/fenêtres, prises électriques, siège auto - dos à la route jusqu'à 15 mois.
- Dépister le stress parental, l'isolement, l'épuisement, bébé secoué

AUDITION

A 30 cm:

- Papier froissé (30–35 dB)
- Hochet (40–50 dB)
- Clochette (50–60 dB)

VUE

- Pas de strabisme, nystagmus, ptosis, déviation oculaire
- Réagit à une lumière vive (réflexe pupillaire direct et consensuel présent).
- Suit le pompon rouge (suivi oculaire) à 180° et en cercle
- Test d'occlusion alternée

STATUS

- ORL:** tympans et gorge calmes, pas de gg sous-angulo-mandibulaire
- 1^{er} dents sortie** **oui** **non**
- CARD:** B1B2 sp, absence de souffle
- RESP:** MV sym., pas de râles ni sibilances, eupnéique
- GI:** ASI, bruits sp.
- OGE:** testicules en place vs pas de coalescence labiale, pas de hernie inguinale ni ombilicale
- Crâne :** pas de plagio-/brachycéphalie, mobilité cervicale sp.
- Cutané:** pas d'angiome géant ou multiples, >3 taches café au lait de >5 mm, eczéma, pâleur

VACCINS

- ROR+/- V**

Signature: