

Vaccins de voyage → [Healthy Travel](#)

Vaccin	Régions	Nom commercial	Doses min. pré-dpt	Délai rec.. dernière dose-dpt	Âge min.	Au cabinet	Prix (CHF)	Indications fortes (durée/exposition)
Hépatite A	Pays hors Europe/OECD	Havrix®	1	7-14 j	≥ 1 an	Oui	50-80	Dès 1 sem. dans un pays à hygiène limitée-repas locaux.
Typhoïde	Asie Sud, Afrique, Amérique Sud	Typhim Vi®	1	10-14 j	≥ 2 ans		45-65	Séjour ≥1-2 sem. Repas locaux/street-food, visites familiales Asie-Afrique-Amérique latine
Rage	Afrique, Asie	Rabipur®	2 (J0-7)	7 j	Tous âges		90-120	> 2-4 sem. en zones rurales, enfants exposés aux chiens (99% des cas), chauves-souris; Accès difficile aux soins.
Méningite ACWY	Afrique, Moyen-Orient	Menveo® MenQuadfi®	1	10 j	≥2 mois ≥15 mois		60-90	Afrique « ceinture méningite » pd saison sèche (déc.-juin-) + pèlerinage à la Mecque + Internat/collectivité > 1 sem.
Méningite B	Pays incidence élevée	Bexsero®	1-2 (J0-M1)	14 j	≥ 2 mois		90-120	Vie en communauté, internats, campus; Séjours prolongés UK/Australie.
Encéphalite à tiques	Europe Est, CH, Autriche	FSME-Immun®	2 (J0-J14)	14 j	≥ 1 an		50-70	≥1 sem. de randonnées, camping en Europe centrale-Nord et Est
Dengue	Amérique latine, Caraïbes, Asie S-E	Qdenga®	2 (J0-M3)	14 j	≥ 6 ans		100-150	Séjour 2 sem. pour enfant déjà séropositif se rendant en zone endémique avec forte exposition aux moustiques Asie SE > Amérique du Sud > Océanie > Afrique
Encéphalite japonaise	Asie Sud-Est, Japon rural	Ixiaro®	2 (J0-J7)	10 j	≥ 2 mois	Non	130-150	Séjour ≥1 mois en zone rurale/rizières ;
Fièvre jaune	Afrique centrale, Amazonie	Stamaril®	1	10 j	≥ 9 mois		70-110	Pays avec vaccin obligatoire : Liberia, Niger, Rwanda, Soudan du Sud, Togo, Ghana, Suriname Séjours >1 sem. en zone tropicale Africaine ou Amérique latine (pas en Asie)