

Nourrissons, enfants et adolescents										
Âge *	Mois							Ans		
Vaccin	Naissance	2	3 **	4	5 **	9	12 ***	12–18	4–7	11–14 /15
VRS Beyfortus®	dose unique d'AcM pour la 1 ^{ère} saison RSV 1)									
DTP Poliomyélite Hib Hépatite B Vaxelis®, Infanrix-hexa®		DTP_a		DTP_a			DTP_a		DTP_a/dTp_a	dTp_a
		IPV		IPV			IPV		IPV	Boostrix® ✓ 10)
		Hib		Hib			Hib	✓ 6)	Tetravac®	
	2)	HBV		HBV			HBV			(HBV) 11) Engerix B 20®
Pneumocoques Vaxneuvance®		PCV 3)		PCV 3)			PCV 3)	✓ 6)		
Rotavirus Rotarix®		RV 4)		RV 4)						
Mén. B Bexsero®			B Bexsero®		B Bexsero®			B 7) Bexsero®		B 7) Bexsero®
Mén. ACWY Menveo®/MenQuadfi								ACWY 7) Menveo®/MenQuadfi		ACWY 7) Menveo®/MenQuadfi
ROR Priorix® +/- Tétra						ROR 5)	ROR 5)	✓ 8)	✓ 8)	✓ 8)
Varicelle Varilix®						VZV	VZV	✓ 9)	✓ 9)	✓ 9)
HPV Gardasil 9®						Priorix® +/- Tétra	Priorix® +/- Tétra			(11-14 ans = 2 d) HPV 12) Gardasil 9®

Vaccin Âge actuel	Nombre de doses ¹⁾	Primovaccination (intervalles, mois)	Premier rappel (intervalle après la première dose, en mois)	Prochains rappels (âge)
DTP_a				
3–5 mois	5	0, 2	8	4–7 ans ^{3) 4)} , 11–15 ans
6–11 mois	5	0, 1 ²⁾	8	4–7 ans ^{3) 4)} , 11–15 ans
12 mois–3 ans	5	0, 2	8	4–7 ans ^{3) 4)} , 11–15 ans
4–7 ans	4	0, 2	8	11–15 ans ^{3) 5)}
dTP_a / dT ⁶⁾				
8–10 ans	4	0 (dTP _a), 2 (dT _a)	8 (dT)	11–15 ans (dT _a) ³⁾
11–24 ans	3	0 (dTP _a), 2 (dT)	8 (dT)	25 ans (dT _a) ⁵⁾
25 ans	3	0 (dTP _a), 2 (dT)	8 (dT)	45 ans (dT) ⁵⁾
26–64 ans ⁵⁾	3	0 (dT), 2 (dT)	8 (dT)	65 ans (dT) ⁵⁾
≥ 65 ans	3	0 (dT), 2 (dT)	8 (dT)	tous les 10 ans (dT) ⁵⁾
IPV ⁷⁾				
3–5 mois	4	0, 2	8	4–7 ans ^{3) 7)}
6–11 mois	4	0, 1 ²⁾	8	4–7 ans ^{3) 7)}
12 mois–3 ans	4	0, 2	8	4–7 ans ^{3) 7)}
4–7 ans	4	0, 2	8	11–15 ans ^{3) 7)}
8–10 ans	4	0, 2	8	11–15 ans ^{3) 7)}
≥ 11 ans et adultes	3	0, 2	8	
Hib				
3–5 mois	3	0, 2	8	
6–11 mois	3	0, 1	8	
12–14 mois	2	0, 2		
15–59 mois (< 5 ans)	1	0		
≥ 5 ans	0 ⁸⁾			
HBV ⁹⁾				
3–5 mois	3 ¹⁰⁾	0, 2 ¹⁰⁾	8 ¹⁰⁾	
6–11 mois	3 ¹⁰⁾	0, 1 ¹⁰⁾	8 ¹⁰⁾	
11–15 ans	2 ¹¹⁾	0	4–6	
≥ 16 ans et adultes	3 ¹²⁾	0, 1	6	
Pneumocoques (PCV)				
3–5 mois	3	0, 2	8	
6–11 mois	3	0, 1	8	
12–23 mois	2	0, 2		
24–59 mois (< 5 ans)	1	0		
5–64 ans	0 ¹³⁾			
≥ 65 ans	1 ¹³⁾			
ROR ¹⁴⁾				
12 mois–18 ans	2	0, ≥ 1		
Adultes nés après 1963 ¹⁵⁾	2	0, ≥ 1		
Adultes nés avant 1964	0			
Varicelle ^{14) 16)}				
12 mois–< 40 ans	2	0, ≥ 1		
HPV ¹⁷⁾				
15–19 ans (adolescent.e.s)	3	0, 2	6	
Méningocoques B				
4–11 mois	3	0, 2	8	
12–23 mois	3	0, 2	14 ¹⁸⁾	
24–59 mois (< 5 ans)	2	0, 1		
16–19 ans	2	0, 1		
Méningocoques ACWY				
19–59 mois (< 5 ans)	1 ou 2 ¹⁹⁾	0, 2		
16–19 ans	1			

Pneumocoque
(Vaxneuvance®)
STOP dès 5 ans (hors FR)

Méningite B
(Bexsero®)
Dès 24 mois: 2 doses (0-1 mois)

Méningite ACWY
(Menveo®/MenQuadfi®)

- 1 an - 18 mois:
 - 1 dose de MenQuadfi®
 - 2 doses de Menveo® (0-2 mois).
- Dès 24 mois:
 - 1 dose de MenQuadfi® ou Menveo®.