

Classification de Tanner

	Fille	Garçon
1		
2		
3		
4		
5		

Tableau 2.1. B Classification de Tanner.

Développement mammaire chez la fille (S)	
S1	Absence de développement mammaire
S2	Petit bourgeon mammaire avec élargissement de l'aréole
S3	Glande mammaire dépassant la surface de l'aréole
S4	Saillie de l'aréole et du mamelon sur la glande, sillon sous-mammaire
S5	Aspect adulte
Développement des OGE chez le garçon (G)	
G1	Testicules et verge de taille infantile : volume testiculaire < 4 ml (longueur testiculaire < 2,5 cm)
G2	Volume testiculaire : 4–6 ml (longueur testiculaire : 2,5–3,0 cm)
G3	Volume testiculaire : 8–10 ml (longueur testiculaire : 3,1–4,0 cm)
G4	Volume testiculaire : 12–15 ml (longueur testiculaire : 4,1–4,5 cm)
G5	Aspect adulte, volume testiculaire : 20–25 ml (longueur testiculaire > 4,5 cm)
Pilosité pubienne (P)	
P1	Absence de pilosité
P2	Quelques poils sur le pubis
P3	Pilosité pubienne au-dessus de la symphyse
P4	Pilosité pubienne triangulaire n'atteignant pas la racine des cuisses
P5	Aspect adulte (triangulaire chez la femme, losangique chez l'homme s'étendant à la racine des cuisses)