

BILAN RHUMATO								
Forme d'AIJ	Signes d'appel distinctifs	FR	ANA	HLA-B27	Anti-CCP	ASLO	Anti-ADN / Anti-Sm	Anti-ENA (SSA, SSB, RNP, Scl-70)
Oligo-articulaire	< 4 articulations, grosses articulations, fille < 6 ans, uvéite silencieuse fréquente	✗	✓ (~60–70 %)	✗	✗	✗	✗	✗
Polyarticulaire FR-	≥ 5 articulations, symétrique, évolution chronique, raideur matinale	✗	✓ (~30–50 %)	✗	✗ / ±	✗	✗	✗
Polyarticulaire FR+	≥ 5 articulations, symétrique, type PR adulte, raideur marquée, ado > 10 ans	✓	✓ (parfois)	✗	✓ (souvent)	✗	✗	✗
Systémique (Still)	Fièvre > 39 °C, rash évanescent, arthrite retardée, adénopathies, sérosite	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Arthrite psoriasique	Arthrite + psoriasis ou ATCD familial, dactylite, atteinte des ongles	✗	✓ (~40–60 %)	✓ (~20 %)	✗	✗	✗	✗
Arthrite liée à l'enthésite	Garçon > 6–8 ans, arthrite asymétrique MI, enthésite, rachialgies, uvéite aiguë	✗	✗	✓ (70–90 %)	✗	✗	✗	✗
Arthrite indifférenciée	Signes mixtes, chevauchement de plusieurs formes	✗ (souvent)	Variable	Variable	Variable	✗	✗	✗
Arthrite réactionnelle post-streptococcique	Arthrite survenant 1–3 semaines après infection ORL streptococcique	✗	✗	✗	✗	✓ (> 200 UI/mL)	✗	✗
Connectivite type lupus associée	Arthrite + rash, photosensibilité, atteinte multiviscérale	✗ / ±	✓	✗	✗	✗	✓ (spécifique lupus)	✓ (connectivites mixtes)